

Como consecuencia final, en vista de su poca tolerancia, estos medicamentos deben darse en todo caso con extremadas precauciones. En ninguna ocasión pueden substituir a un régimen bien planeado a base de la restricción del sodio.

DESODORIZACION DE LAS COLOSTOMIAS CON LA CLOROFILA

Dr. MICHAEL WEINGARTEN y colaboradores

De los Departamentos de Gastroenterología y de Cirugía del "Beth Israel Hospital", Nueva York, N. Y.

UNA de las consecuencias más penosas de la colostomía, tanto para el operado como para quienes le rodean, es el mal olor que despiden la herida, tan difícil de disimular. En el hospital, en su casa y en la vida social, el paciente se siente deprimido y temeroso, por lo que deben intentarse todas las medidas al alcance de la profesión médica para vencer dicha situación.

En 1947, BOWERS señaló los efectos de los preparados solubles de clorofila en la cicatrización de las heridas, sobre todo en los casos de osteomielitis abiertas y malolientes; después se ha repetido la prueba de que los derivados de la clorofila, tomados por vía oral en forma de tabletas, desodorizaban el aliento, la orina y otros malos olores del cuerpo. No se apreciaron reacciones nocivas con ninguno de estos preparados, a pesar de tomarse a dosis elevadas.

En vista de estas observaciones, pareció plausible que la clorofila, tomada por vía oral en cantidad suficiente, podía estar indicada en la desodorización de las colostomías, emprendiendo los autores una investigación. Se administraron pastillas fácilmente solubles en la saliva, a razón de 5 al día. A las 48 horas se apreció en los 9 casos ensayados manifiesta reducción del olor ofensivo, hasta el punto de que los pacientes pidieron el medicamento para continuar su ingestión al ser dados de alta.

Es inútil reseñar estos casos porque los resultados fueron invariablemente excelentes en todos ellos. Se apreció que si bien una tableta de chloresium (*) 4 veces al día reducía considerablemente el mal olor de la colostomía hasta eliminarlo, al prescribirse 8 tabletas diarias se obtenían resultados más rápidos y más completos.

La lógica de estas observaciones es que el empleo de las tabletas de

"Rev. of Gastroenterology", agosto 1951.

* Producto de la Rystan Company, Inc.

chloresium en los hospitales puede eliminar de modo eficaz el mal olor de los recipientes de evacuación en los casos de los pacientes no quirúrgicos encamados junto a otros en los cuartos semiprivados, e incluso si están en habitaciones privadas, pues indudablemente se sentirán más tranquilos y libres de la aprensión que les ocasiona saber que pueden molestar a las enfermeras y demás personal que los atiende.

RESINAS DE CATION VARIABLE COMO MEDIO COMPLEMENTARIO DE TRATAMIENTO EN LA INSUFICIENCIA CARDIACA

Dr. J. EDWIN WOOD y colaboradores

De la Sección de Enfermedades Cardiovasculares en el Departamento de Medicina Interna de la Escuela de Medicina de la Universidad de Virginia

COMO es sabido, la restricción en la ingestión de sodio es medida terapéutica aceptada en muchas formas de edema, aunque la absorción ideal de la sal sódica no es posible regularla sólo con el régimen. Por este motivo, se ha recurrido a las resinas de catión variable, una de las cuales, con el nombre de "resodec", ha servido para la experimentación en los pacientes que forman el material de estudio del presente escrito. El resodec se administró a 3 sujetos sin edema, a 22 pacientes con insuficiencia cardíaca, a 5 con cirrosis hepática y ascitis, a 3 con edema consecutivo a un síndrome nefrótico y a 2 con pericarditis.

Indicaciones

Muchos pacientes cardíacos responden bien largo tiempo al reposo, digital y restricción moderada de sodio; sin embargo, en otros ocurre lo contrario, y en ellos estará indicada la administración de las resinas de catión variable. Esta indicación es más precisa en los enfermos de tipo crónico en quienes ya no dan buen resultado los diuréticos mercuriales.

Administración y dosis

La dosis del resodec y el régimen a seguir durante su administración, dependen en buena medida del grado y duración del edema, así