


## El Mussol comú (*Athene noctua*)

Aquest ocell comunament es veu sobre els pals de telèfon i electricitat com una boleta al cap damunt que espera el pas d'algun ratolí o algun altre petit rosegador. És el mussol comú que, tot i el que pugui semblar a primer cop d'ull, és força comú entre nosaltres.

Aquest rapinyaire és de mida petita, fa uns 21 centímetres, rabassut i amb el cap aplanat. Les parts superiors són de color marró fosc molt pigallades i barrades de blanc. Les parts inferiors són blanquinoses àmpliament llistades de marró fosc.

Tot i els seus moviments graciosos, el nostre mussolet té una expressió ferotge i malcarada a causa del cap i la cara aplanats i els ulls grocs.

El nostre mussol ocupa la major part dels territoris del poble, tot i que és més abundant als conreus d'avellaners, olivers... de les parts més baixes. Tot i que no deu ser estrany veure'l entrar al poble en llocs com el cementiri i altres llocs tranquils i sense vegetació.



El mussol comú

És molt sedentari, no efectua cap mena de migració regular, tot i que algun ocell erràtic centreeuropeu pot aparèixer entre nosaltres a l'hivern.

L'aspecte ferotge d'aquest ocell no es correspon amb la realitat.

L'hàbitat preferit pel mussol comú, tant a l'hivern com a l'època de reproducció, són els conreus de la plana, en camps d'arbres (com olivers, garro-

---

fers, fruiters, etc...) situats a prop d'espais oberts, o també a prop de masies aïllades. Però també el podem trobar en clarianes i camins dins de boscos clars i assolellats. Quan el bosc esdevé més espès i extens, el mussol comú ja comença a ser força més escàs.

L'època de nidificació comença al març, quan té lloc la parada nupcial que consisteix en posar-se en una branca i emetre sons alhora.

El niu es pot trobar en llocs molt diferents, ja siguin forats a les teulades de construccions deshabitades, parets de construccions també deshabitades, marges pedregosos, forats d'arbres (d'olivers, garrofers, ja siguin a ras de terra, més amunt, i fins i tot sota terra), i també antics caus de conills. Els nius poden estar recoberts de llana d'ovella o de plomes d'ocell (dels pares i d'altres exemplars, o d'altres espècies).

Els ous apareixen a finals d'abril i principis de maig. La femella incuba els ous i el mascle resta a les proximitats. Els polls surten de l'ou a finals de maig o a primers de juny.

A finals de juny apareixen els primers polls semiplomats a la sortida del niu. A principis de juliol, els primers polls ja comencen a allunyar-se més del niu i a volar.

Les seves preses són: ratolins, talpons, rates, cuques, ocells petits, sargantanes, artròpodes, cucs...

Comença la caça després d'abandonar el seu lloc de descans diürn, quan la foscor és més important el mussol comú se situa en alguna de les seves talaies de caça.

**ALBERT CAMA TORRELL**

## **BIBLIOGRAFIA**

FERRER, Xavier; MARTÍNEZ, Albert; MUNTANER, Jordi, i altres: *Fauna dels Països Catalans*, vol. 4, Enciclopèdia Catalana, Barcelona 1994

PETERSON, Roger; MOUNTFORT, Guy; HOLLAM, P.A.D.: *Guia dels ocells dels Països Catalans i d'Europa*. Barcelona 1991

LATORRE, José Antonio: *Fauna vertebrada del Tarragonès*, Constantí 1995