

COMUNICACIÓNS

Nota dels moluschs recollits en l' excursió espeleològica al arench d' en Roca (Corbera)

—*Hyalinia (Polita) Courquini* Bourg. Un exemplar mort, junt á la boca del avench; quatre de morts y un de viu dins l' avench á tretze metres sota terra probant que hi te estada.

—*Hyalinia (Polita) Harlei* Fagot. Un sol exemplar mort y defectuós á tretze metres de fondaria, casi enterrat dins una estalactita.

—*HELIX (XEROPHILA ORDALENSIS)* Serradell (n. sp.).

T. perforata conico-semiglobosa lœvigata, nitidula, albida vel sordide fasciata in ultimum anfractum, fasciis interruptis, regulariter oblique ruguloso-striatula; anfractibus 5 $\frac{1}{2}$ —6, vix convexiusculi, ultimus in extremis parum descendens; spira elevata, apice cornea, sutura impressa, separatis; apertura rotundata, obliqua, brevis; peristomate acutum, intus labiatum, robustum, margine columellari subdilatato; umbilicus mediocris pervius. — Diam. maj. 10-12, min. 9-10 $\frac{1}{2}$, alt. 8-10 $\frac{1}{2}$, umbilicus max 1. mill.

Difereix del *H. acomtiella* Ancey, per presentar les voltes d' espira casi planes, la sutura bordejada per la carena y apenas decliu en sa extremitat; la forma es més estretament cònica, l' àpice mitj transparent y la boca més arrodonida al ensems que petita y menys transversal, el llabi més robust y quelcom més reflex; aduch que més estretament umbilicada.

Del *Helix grannonensis* Serv. se 'l distingeix á colp d' ull per esser més cònic, tenint l'última volta menys ampla y més decliu; del grupu del *H. aspila* Bourg, les diferencies son remarcables, car n' es aquest més globulos y son àpice es negre blavós.

Habita al indret del Maset de cà 'n Dispanya, junt á la carretera d' Ordal, y viu demunt les plantes seques. Abundant.

Helix (Xerophila) megastoma Hidalgo. Aqueix se troba en tota aquella regió.

Helix (Xerophila) Penchinati Bourg. Un exemplar mort apropi l' avench.

Helix (Tachea) splendida Drap. var. *microstoma* Salvanyá. Diferents exemplars junt al avenc, axis com en el fons del mateix, essent aquests morts, fent suposar, qu' hi caigueren y que no hi habita per mancarli condicions favorables.

Helix (Macularia) apalolena Bourg. var. *lucida* Fagot. Un hermos exemplar entre 'ls rochs d' un marge enfront el Maset de cà'n Dispanya.

Pupa (Torquilla) Montserratica Fagot. Del mateix modo que 'l *H. splendida* ja citat.

Cyclostoma elegans Mull. Ab iguals condicions que l'anterior, trobantne á dins y á fora.

Barcelona 2 Janer 1908.

DR. BALTASAR SERRADELL

Contribució á la Nomenclatura ornitològica

Sobre el canvi de nom del genre

Caprimulgus, Linnœus

Hi ha en l' estudi de l' Historia Natural tanta materia, que no es estrany que molta cosa estigui per fer. Ocupats els sabis en les qüestions fonamentals, no han descendit á certes qüestions de detall, dexades als petits aimants de la ciencia dels éssers de la Terra. Avuy, vinch á parlarvos d' una d' aquestes qüestions de detall, que, no per esserho, crech mancada d' interés pera la ciencia zoologica, y especialment pera la bona intel·ligència ó popularisació de la meteixa entre la multitud.

Crech que es necessari tenir un bon nom pera cada especie; es dir, un nom que 'ns evoqui ab la major justesa la característica del ésser; y á aquesta creencia crech que tots hi assentiréu. Perque tenint cada ésser una característica, essent un agent de treball en