

ALIGOT *BUTEO BUTEO*



Família: Accipítrid

Descripció: Rapinyaire diürn de mida mitjana, d'uns 55 cm. d'altura i una envergadura d'uns 120 cm. amb les ales obertes. Tot i que presenta coloració molt variable, és predominantment marró fosc per sobre i més clar per sota, sovint amb una banda fosca més aparent a l'altura del pit. En vol presenta unes ales arrodonides i quan planeja crida l'atenció la posició de les ales en forma de V.

Distribució i hàbitat: Es troba present pràcticament a tot Europa, amb preferència pels ambients de mosaic amb boscos diversos, prats i camps de conreu. A Catalunya es troba repartit per tot el territori, però l'abundància és màxima a les zones de muntanya mitjana humida entre els 400 i els 1.600 metres d'altitud, com és el cas del Collsacabra.

Fenologia i moviments: Al Collsacabra es poden observar aligots tot l'any perquè una part de la població hi cria, però a l'hivern és més fàcil d'observar-los perquè n'arriben una gran quantitat provinents del centre i nord d'Europa buscant un lloc més càlid on passar els mesos de fred.

Alimentació: Depredador. Els aligots s'alimenten de ratolins, rates, llangardaixos, serps, petits ocells i fins i tot cucs i grans insectes. El seu sistema de caça es basa en observar pacientment des d'una atalaia, que sol ser un pal telefònic o un arbre exposat, a l'espera de detectar el moviment de les seves preses. En aquest moment es llença a la seva captura.

BERNAT PESCAIRE

ARDEA CINEREA



Família: Ardèids

Descripció: Es tracta d'un ocell de grans dimensions (un metre d'altura i una envergadura de 150 a 175 cm. amb les ales obertes) amb un plomatge de tonalitats griseses. Com la resta d'ardèids el bernat pescaire es caracteritza per tenir les cames llargues, el coll llarg i el bec gros i punxegut. En vol sembla immens i manté les cames esteses i el coll arronsat.

Distribució i hàbitat: Es un ocell distribuït per tot Europa i per tot el territori català. El seu hàbitat predilecte per a nidificar són els cursos o masses d'aigua amb vegetació abundant i grans àrees obertes al voltant.

Fenologia i moviments: Es pot observar durant tot l'any, però a la primavera i estiu només prop de les zones de cria, que són els boscos de ribera dels principals rius del país. Per això al Collsacabra només s'observa a la tardor i a l'hivern, que coincideix amb una augment notable de la població amb l'arribada d'exemplars del nord d'Europa que passen l'hivern a casa nostra.

Alimentació: El bernat s'alimenta de peixos, amfibis, ratolins i grans insectes que captura mantenint-se immòbil enmig d'un riu o un camp, esperant el millor moment per llençar un ràpid atac amb el bec sobre la presa arribant a travessar-la en alguns casos.

ALIGOT



BUTEO BUTEO

BERNAT PESCAIRE



ARDEA CINEREA