

FALCIOT NEGRE

Apus apus

Família: *Apodidae* (falcions)

Descripció:

El falciot negre, igual que els altres ocells de la seva família, sovint és confós per una oreneta, però la seva mida és bastant més gran (fins a 40 cm amb ales obertes) i mai presenta la panxa blanca, sinó que és totalment negre tant per sobre com per sota. En ser un ocell estrictament aeri, el seu cos està totalment adaptat al vol: coll i cua curtes, ales molt llargues i punxegudes i una forma aerodinàmica de falç (d'aquí el nom).

Als capvespres d'estiu acostuma a volar en grans estols per sobre de pobles i ciutats emetent el seu característic cant cridaner "srrriiiiiir".

Distribució i hàbitat:

Té una distribució eurasiàtica, des del nord d'Àfrica fins al nord d'Europa i des de Portugal fins a la Xina. És un ocell que sempre el trobarem en vol en espais oberts, ja que només toca terra en època de cria, quan fa el niu sota teulats o en forats d'edificis en ciutats i pobles. Al Collsacabra, aprofita les escletxes de les cingleres per fer el niu.

Fenologia i moviments:

A Catalunya arriba cap al mes d'abril i s'hi passa tot l'estiu fins a l'agost o principis de setembre, just quan ha acabat la cria dels polls. Llavors es mou cap al sud d'Àfrica, travessant el desert del Sàhara per hivernar-hi. Són ocells molt fidels, tant a la parella com al lloc de cria, i a la Muralla de Vic s'ha certificat aquesta fidelitat en algunes parelles durant més de 15 anys!

Alimentació:

El falciot negre, com la resta de membres de la seva família, s'alimenta d'insectes voladors, que caça al vol en grans quantitats de manera continuada exercint un paper important contra la proliferació de mosquits, per exemple.

Foto: Pau Artigas



BALLESTER

Apus melba

Família: *Apodidae* (falcions)

Descripció:

El ballester és similar en forma al falciot negre, però encara és més gran (arriba als 58 cm d'envergadura) i se'l diferencia fàcilment per tenir el ventre i la gola de color blanc. A més, el color general del cos acostuma a ser marró castany, més pàl·lid que el falciot negre. Les ales són allargades i punxegudes, el coll molt curt i la cua curta i forçada cosa que el fa similar a una ballesta, d'aquí el seu nom. També s'identifica fàcilment pel seu crit, un allargat i característic "titititititi ti-ti-ti-ti ti ti" que es va alentint al final i que emet en vol.

Distribució i hàbitat:

Es troba àmpliament distribuït al voltant del Mediterrani, des de Portugal fins al mar Caspi, tot el nord d'Àfrica i el sud d'Europa. No obstant, no és un ocell que depengui del litoral, sinó de la presència de cingleres, penya-segats i congosts on fer el niu. Cria en colònies, és a dir que fan els nius molt a prop d'altres exemplars de la seva espècie. Igual que els falcions, sempre el veurem en vol, ja que només s'aturen quan entren al niu; fins i tot la còpula és aèria...

Fenologia i moviments:

Donat que el ballester és un ocell migrador, arriba al Collsacabra cap al mes d'abril, bastant abans de la seva cria, i marxa cap a l'octubre, més tard que el falciot negre. Hivernen al sud d'Àfrica i a l'illa de Madagascar.

Alimentació:

Sempre s'alimenta en vol, mantenint la seva gran boca oberta mentre travessa núvols d'insectes. Per veure aigua passa volant arran de l'aigua en basses o rierols!

Foto: Steve Arlow



FALCIOT NEGRE



Apus apus

BALLESTER



Apus melba