

# El pardal comú i el pardal xarrec

David Agudé Vidal

En aquest número de Lo Floc aprendrem a distingir dues espècies de pardals que podrem trobar fàcilment pel poble i el terme de Riudoms.

Tant el pardal comú (*Passer domesticus*) com el pardal xarrec (*Passer montanus*) pertanyen a la família *Passeridae*, de la qual en formen part moixons petits amb el bec robust i adaptat a menjar llavors.

El pardal comú, fàcilment identificable per qualsevol persona, habita de forma natural per gairebé tot el continent d'Euràsia, malgrat que també es troba introduït per la mà de l'home a gairebé tot el continent d'Amèrica, sud d'Àfrica i Austràlia. Al nostre país, aquest moixó acostuma a viure i criar tant a zones urbanes

Pardal xarrec anellat al terme de Riudoms, on es pot apreciar la característica taca negra de la galta.  
Foto: David Agudé Vidal.



com rurals, aprofitant qualsevol forat per fer-hi niu, ja sigui natural o artificial. Com que gairebé tothom ja coneix tant la morfologia com la coloració del pardal comú, ens centrarem en la identificació entre pardals mascles i femelles. Podrem distingir un pardal pel que fa al seu sexe segons la coloració de les plomes. Durant l'estiu els pardals mascles presenten una gran taca negra al pit i la part superior del cap de color gris (durant l'hivern aquestes dues coloracions característiques es difuminen). En canvi, els pardals femelles no presenten aquesta taca negra al pit i, en general, són d'un color marró més apagat i amb un aspecte més grisós. S'alimenten d'insectes i llavors, tot i que també acostumen a alimentar-se de qualsevol deixalla comestible que hi hagi a les ciutats i pobles.

Un altre pardal, potser menys conegut, és el pardal xarrec. Aquest, a diferència de l'anterior, acostuma a viure en zones més rurals, com ara camps de cultiu. La seva distribució no és tan àmplia com la del pardal comú, ja que es troba de forma natural per tot el continent d'Euràsia i arriba fins a les illes del sud-est asiàtic (Indonèsia, Malàisia i Filipines). De la mateixa manera que l'anterior, fa el niu en forats tant naturals com artificials. Tot i que aquest és una mica més petit que l'anterior, la seva coloració, morfologia i aspecte general és molt semblant al del pardal comú. Però el po-



Pardal comú femella, amb tons més apagats que no pas un pardal mascle.  
Foto: David Agudé Vidal.

drem distingir fàcilment d'aquest perquè el xarrec té una característica taca negra a cada galta i, a més, la part superior del cap és totalment marró. S'alimenta principalment de llavors.

Per tant, la distinció entre pardal comú i xarrec és clara. A més, podrem estar quasi del tot segurs que tots els pardals que habiten al poble de Riudoms són pardals comuns. En canvi, si ens trobem pels voltants agrícoles de Riudoms i volem distingir quina espècie de pardal hem vist, ens haurem de fixar bé en la seva coloració. >>