NUEVA ESPECIE DEL GENERO TYPHLOCHLAMYS ESP. (COL. CATOPIDAE)

por

JORDI COMAS (1)

RÉSUMÉ

A l'occasion de recherches biospéléologiques au Levant espagnol mon collègue et ami M. O. ESCOLA a bien voulu me confier l'étude d'un nouveau *Typhochlamys* que je suis heureux de lui dédier. Il s'agit du deuxième représentant du genre qui se place au voisinage du *T. bardisai* Esp., seul connu jusqu'à présent, mais il se distingue nettement de ce dernier par la taille plus petite, le prothorax moins transverse, les élytres plus longs et légèrement sinués, les antennes plus robustes avec la massue plus large, enfin par les paramères de l'édéage aussi longs que le lobe moyen (bien plus longs que le lobe moyen chez *bardisai*).

Prosiguiendo el estudio de la fauna cavernícola del Levante español, sector que se ha revelado particularmente interesante por lo que a la fauna troglobia se refiere, me ocupo en la presente nota de un nuevo *Typhlochlamys* cuyo estudio me ha sido confiado por su recolector, el amigo O. ESCOLA, a quien me complazco en dedicar tan interesante novedad.

Typhlochlamys escolai nov. sp. (fig. 1).

Holotipo, ♂, Avenc del Caldero, Tibi, Alicante, 30-X-77 (O. ESCOLA leg., Museo de Zoología de Barcelona). Paratipos, 6 ♂♂ y 7 ♀♀, recogidos con el holotipo (Museo de Zoología de Barcelona y mi colección).

Longitud 1,8 mm. Forma elíptica y aplanada; antenas largas, alcanzando la parte media de los élitros, con el I artejo más corto que el II, el III, IV y V iguales, el VIII tan largo como ancho, y el XI vez y media más largo que ancho; protórax transverso, vez y media más ancho que largo, estrechado por delante y con los ángulos posteriores entrantes; élitros doble tan largos como anchos, con los bordes humerales ligeramente sinuosos; patas gráciles; protarsos del ♂ dilatados, casi tan anchos como el borde apical de las tibias; edeago (fig. 2) largo y estrecho, con los parámeros tan largos como el lóbulo medio y armados de tres sedas apicales; saco interno tal como muestra la fig. 3.

(1) C. Floridablanca, 112, 4.º, 4.ª. Barcelona-15.

Especie a situar en la vecindad de *T. bardisai* Esp., único representante del género conocido hasta el presente; bien diferente no obstante de éste por su talla sensiblemente menor, por el protórax menos transverso, por los élitros más largos y ligeramente sinuados, por las antenas más robustas y con la maza más ancha, por los protarsos del ♂ más anchos y por el edeago más estrecho, con los parámetros tan largos como el lóbulo medio (más largos que el lóbulo medio en *bardisai*).



Fig. 1. — *Typhochlamys escolai* n. sp. ♂.



Figs. 2-3. — *Typhochlamys escolai* n. sp.: 2) edeago; 3) saco interno del mismo.

BIBLIOGRAFIA

COMAS, J. — 1977. Nueva especie de *Spelaeochlamys* Dieck (Col. *Bathysciinae*). *Misc. Zool.*, 4, (1): 217-219.

ESPAÑOL, F. — 1975. Un nuevo *Bathysciinae* del Levante español (Col. *Catopidae*). *1er. Cent. R. Soc. Esp. Hist. Nat., vol. extr.*: 121-125.

GUEORGUIEV, V. B. — 1976. Recherches sur la taxonomie, la classification et la phylogénie des *Bathysciinae* (Col. *Catopidae*). *Razprave* IV, *razreda SAZU*, XIX/4: 92-129.

JEANNEL, R. — 1924. Monographie des *Bathysciinae*. *Arch. Zool. Exp. Gén.* 63. *Biospeol.* L: 46-51.

LANEYRIE, R. — 1976. Nouvelle classification des *Bathysciinae* (Col. *Catopidae*). *Ann. Spéléol.*, 22 (3): 588-596.