



---

## **UTILIZACIÓN DE SEDACIÓN ANESTÉSICA EN PACIENTES CON CUADROS CONVERSIVOS. A PROPÓSITO DE TRES CASOS**

A. Serrano-García, C. Martínez-Martínez,  
R. Gómez-Martínez, J. Valdés-Valdazo,  
V. Amez-Cepeda, C.M. Franch-Pato

Complejo Asistencial Universitario de León. Servicio de Psiquiatría

**Introducción:** Algunos cuadros conversivos se mantienen en el tiempo y no responden a un abordaje psicofarmacológico/ psicoterapéutico habitual. Es preciso plantearse entonces otras opciones terapéuticas.

**Objetivos:** Describir el procedimiento y la evolución en tres casos de trastorno conversivo prolongado

**Material y métodos:** Tras la revisión de la historia clínica y una evaluación multidisciplinar que descarta origen somático, el psiquiatra indica el abordaje del cuadro mediante sedación. Tras obtener

consentimiento informado se realiza una sedación bajo control anestésico y se explora al paciente física y psicopatológicamente. Se graba la intervención y posteriormente se confronta al paciente con ella.

**Resultados:** Caso 1. Paraplejía de dos años de evolución con falta de control de esfínteres. Actualmente asintomático y trabajando. Caso 2. Tetraplejía y sonda de alimentación. Diagnosticado erróneamente de ELA. Actualmente retirada sonda de alimentación y moviliza sin limitación dos brazos y una pierna, logra bipedestación. Caso 3. Disonía focal en mano derecha. Actualmente mejoría parcial y adquirido adecuado insight.

**Conclusiones:** La sedación bajo control anestésico debe considerarse en casos de trastornos conversivos prolongados que no responden a psicofármacos o psicoterapia.