



## CARACTERÍSTICAS DEL PERFIL PSIQUIÁTRICO DEL PACIENTE CON TRASTORNO POR RUMIACIÓN.

Rodríguez-Urrutia A, Sibuet-Ruiz I, Barba E, Accarino A, Malagelada C, Azpiroz F, Eiroa-Orosa FJ.

Hospital Universitario Vall d'Hebron, Universidad de Barcelona.

**Introducción:** La etiopatogenia de la rumiación es desconocida. Desde la psicopatología se define como un trastorno de la conducta alimentaria (DSM-5) y desde el punto de vista digestivo como un trastorno funcional (Roma-IV). La psicopatología asociada a los trastornos funcionales digestivos es frecuente (50%) pero se desconoce la psicopatología asociada específicamente a la rumiación.

**Objetivos:** Determinar el perfil psicopatológico en rumiación.

**Material y Métodos:** Se incluyeron de forma prospectiva pacientes con rumiación entre 2010 y 2018. Los pacientes se catalogaron además de dispepsia funcional si cumplían criterios de Roma III. Como grupo control se incluyó un grupo de pacientes con dispepsia funcional exclusivamente. Todos los pacientes se valoraron mediante una entrevista psiquiátrica y los cuestionarios SCL-90-R, HADS, SF-36.

**Resultados:** Se incluyeron un total de 58 pacientes. Se excluyeron los que no habían cumplimentado los cuestionarios y el análisis final se realizó con 36 pacientes (18 hombres, 18 mujeres, 14-83 años). El grupo de rumiación y dispepsia funcional incluyó 11 pacientes, el de rumiación 25 y el de dispepsia funcional 24. El porcentaje de psicopatología fue similar en los tres grupos: 45% en dispepsia funcional y rumiación, 48% en rumiación, y 71% en dispepsia funcional ( $p=.193$  entre los tres grupos). También fue similar la presencia de depresión (60% en dispepsia funcional y rumiación, 50% en rumiación y 29% en dispepsia funcional;  $p=.352$ ) y de ansiedad (20% en dispepsia funcional y rumiación, 17% en rumiación y 12% en dispepsia funcional;  $p=.344$ ).

**Conclusiones:** El perfil psicopatológico en la rumiación es similar a otros trastornos funcionales digestivos.