



## ¿Está relacionado el bajo apoyo social percibido con la autolesión?: Resultados preliminares en una muestra clínica de adolescentes

Stella Nicolaou, Carlos Schmidt & Daniel Vega

Hospital Universitario de Igualada (Consorti Sanitari de l'Anoia). Departamento de Psiquiatría y Medicina Legal, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

### **Objetivos:**

Este estudio pretende explicar la relación entre bajo apoyo social percibido (ASP) y la autolesión no suicida (ANS) en una muestra clínica de adolescentes, analizando el papel mediador de los rasgos TLP.

### **Material y Métodos:**

Un total de 228 pacientes adolescentes (entre 12 y 18 años) completaron entrevistas clínicas y medidas de autoinforme para evaluar la presencia de ANS, rasgos TLP, malestar psicológico actual y ASP. Se realizaron análisis de regresión logística univariantes y multivariantes y un análisis de mediación para examinar el papel intermediario de los rasgos TLP en la relación entre ASP y ANS.

### **Resultados:**

Un bajo ASP predijo la presencia de la ANS en el análisis univariante, pero no en el multivariante. En los análisis de mediación, los rasgos TLP explicaban completamente la relación entre bajo ASP y ANS.

### **Conclusiones:**

Los hallazgos sugieren que los adolescentes con bajo ASP tienen un riesgo elevado de ANS porque tienen más rasgos TLP. En el ámbito clínico, las intervenciones dirigidas a reducir los síntomas TLP podrían ser una opción de tratamiento prometedora para los adolescentes con ANS y bajo ASP.