



Aspectos críticos en la salud ginecológica en mujeres con trastorno delirante: una revisión sistemática.

Alexandre González-Rodríguez¹, Armand Guàrdia ¹, Aida Álvarez ², Mentxu Natividad ¹, Marta Marín ¹, Javier Labad ³, José Antonio Monreal ⁴.

1. Servicio de Salud Mental. Hospital Universitario Mutua de Terrassa. Universitat de Barcelona (UB). Terrassa, Barcelona.

2. Servicio de Salud Mental. Hospital Universitario Parc Tauli. I3PT. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Sabadell, Barcelona.

3. Servicio de Salud Mental. Consorci Sanitari del Maresme. I3PT. Institut de Neurociències. Universitat Autònoma de Barcelona. CIBERSAM. Mataró, Barcelona.

4. Servicio de Salud Mental. Hospital Universitario Mutua de Terrassa. Universitat de Barcelona (UB). CIBERSAM. Institut de Neurociències. Universitat Autònoma de Barcelona. Terrassa, Barcelona.

Introducción

Estudios recientes reportan que las mujeres con esquizofrenia acuden con menor frecuencia a las revisiones ginecológicas y a los test de cribado respecto a la población general. En mujeres con trastorno delirante (TD) son escasos los estudios disponibles,

Objetivos

Investigar los resultados de salud ginecológica en mujeres con TD. Discutir estrategias preventivas y circuitos asistenciales para mejorar los resultados de salud en TD.

Métodos

Revisión sistemática en PubMed de los estudios centrados en la salud ginecológica en mujeres con TD entre 1990-2021 (guías PRISMA). Términos búsqueda: (gynecology OR gynecological) AND ("delusional disorder" OR psychosis). Se realizó un análisis cualitativo/crítico de los resultados.

Resultados

Se obtuvieron un total de 273 artículos, de los cuáles 6 se incluyeron. A)40% de mujeres con TD presentan trastornos ginecológicos a lo largo de la vida, siendo el mioma uterino el más frecuente (36.7%), y la histerectomía la intervención quirúrgica más frecuente (8%). B) estudio reciente muestra que el 48% de las mujeres no realizó visitas ginecológicas en los últimos 2-3 años. Edad media de la menopausia fue de 48 años. C)La asociación entre cáncer de mama y uso de antipsicóticos es controvertida. D)El periodo de transición a la menopausia es de especial vulnerabilidad en psicopatología y salud ginecológica. E)Existe una falta de estudios de intervención preventiva en mujeres con TD.

Conclusiones

Se requiere de una mayor coordinación entre los equipos de atención primaria y salud mental mediante programas de colaboración (PSP) para incrementar las tasas de adherencia del cribado de los principales cánceres ginecológicos.