



Predictive factors for cocaine use disorder and its treatment outcomes: a systematic review

Alba Palazón-Llecha (1, 2) i Núria Mallorquí-Bagué (1)

Entidad: (1) Hospital de la Santa Creu i Sant Pau – Biomedical Research Institute Sant Pau (IIB Sant Pau); (2) Estudiante del programa de doctorado en Psicología, Salud i Calidad de Vida de la Universitat de Girona (UdG)

Objetivo: explorar los factores predictores de los resultados de tratamiento en pacientes ambulatorios que presentan un trastorno por consumo de cocaína.

Material y método: se ha realizado una búsqueda de ensayos controlados aleatorizados publicados en inglés en las bases de datos PubMed, APA PsycINFO y Web of Science, publicados desde el inicio hasta la actualidad y que han medido específicamente los factores predictores de los resultados de tratamiento en pacientes ambulatorios con consumo de cocaína.

Los ensayos incluidos son aquellos en que los participantes tienen 18 años o más y se encuentran bajo tratamiento ambulatorio por el consumo de cocaína. Además, los participantes de los estudios deben presentar un trastorno por consumo de cocaína determinado a partir de alguna medida específica, como los criterios DSM-5 o el test de drogas en orina. Se excluyen los estudios en los que

la muestra se encuentra bajo otro tipo de tratamiento que no sea el ambulatorio. Tampoco se consideran los estudios en los que los participantes no presentan un trastorno por consumo de cocaína.

Se espera utilizar el diagrama PRISMA para ilustrar el proceso de selección de los estudios incluidos.

Resultados y conclusiones: aunque la revisión sistemática aún no está finalizada, posteriormente se elaborará una síntesis cualitativa para identificar los factores que predicen los resultados de tratamiento, es decir, las tasas de retención al tratamiento, de recaída, de abandono y de abstinencia después de recibir el tratamiento ambulatorio.