

NOTÍCIAS

NEWS

SECCIÓN ACTUALIZACIÓN Y REFLEXIONES EN SEXOLOGÍA

NEWS AND THOUGHTS ON SEXOLOGY


Alejandro Villena-Moya¹, Iris Tolosa², Enrique Normand¹, Amaia Miren Ciaurriz¹, María Martín-Vivar^{1,4}, Gabriel Serrano¹,
Gema Chenoll¹, Andrea Galarreta¹, Gemma Mestre-Bach^{2,3}, Carlos Chiclana-Actis¹

1. Grupo de trabajo e Investigación en sexualidad consulta Dr. Carlos Chiclana. 2. Psicóloga HUD. Consejo de redacción.
3. Universidad Internacional de la Rioja. Consejo de redacción. 4. Universidad Francisco de Vitoria.

Palabras clave: Sexología, salud sexual, sexología clínica & terapia sexual.

RESUMEN: RESUMEN: se presenta en esta sección una revisión de los artículos científicos de mayor impacto publicados entre agosto de 2022 y noviembre del 2022 en las revistas internacionales sobre Sexología con mayor reconocimiento a nivel nacional e internacional (Journal of Sexual Medicine; International

Journal of Sexual Health; Archives of Sexual Behavior; Sex roles; Sexual Addiction & Compulsivity, Psychology and Sexuality; Culture, Health and Sexuality; DeSexología, Psicología de la orientación sexual y la diversidad, American Journal of Sexual Education, Journal of Sex & Marital Therapy y Violence Against Woman).



REACCIONES EMOCIONALES AL SEXO DE ALTO RIESGO ENTRE HOMBRES DE MINORIAS SEXUALES: EXPLORACIÓN DE OPORTUNIDADES POTENCIALES PARA UNA INTERVENCIÓN JUSTO A TIEMPO (1)

EMOTIONAL REACTIONS TO HIGH-RISK SEX AMONG SEXUAL MINORITY MEN: EXPLORING POTENTIAL OPPORTUNITIES FOR JUST-IN-TIME INTERVENTION.

Tyler B. Wray, Noah N. Emery and John P. Guigayoma.

Publicación: The Journal of Sex Research.

DOI: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00224499.2022.2113854>

Cita completa: Tyler B. Wray, Noah N. Emery & John P. Guigayoma (2022) Emotional Reactions to High-Risk Sex among Sexual Minority Men: Exploring Potential Opportunities for Just-In-Time Intervention, The Journal of Sex Research, DOI: 10.1080/00224499.2022.2113854

RESUMEN DEL ARTÍCULO

Antecedentes: las tasas de VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS) son elevadas entre los hombres de minorías sexuales. Se ha investigado mucho sobre los determinantes del comportamiento de riesgo de VIH/ITS, pero pocos estudios han explorado las consecuencias emocionales de estos eventos.

Objetivo: el objetivo de este estudio es analizar las consecuencias emocionales que producen las infecciones de transmisión sexual.

Método: se realizó un estudio de evaluación momentánea (EMA) de 100 hombres homosexuales VIH-negativos/desconocidos para comprender los patrones de afecto positivo, afecto negativo, vergüenza y estrés en las 24 horas posteriores al sexo.

Resultados: los resultados mostraron que la probabilidad de afecto negativo fue mayor en las horas siguientes al sexo anal sin preservativo (SASP) con parejas de alto riesgo durante las cuales los participantes informaron estar bajo la influencia del alcohol o las drogas, frente a todos los demás tipos de eventos sexuales.

Conclusión: los hallazgos sugieren que las horas siguientes a los eventos de hombres involucrados en el SASP pueden ser un momento oportuno para intervenir y para ayudar a

los varones homosexuales a evitar experiencias adversas similares en el futuro.

1. Tyler B. Wray, Noah N. Emery & John P. Guigayoma (2022) Emotional Reactions to High-Risk Sex among Sexual Minority Men: Exploring Potential Opportunities for Just-In-Time Intervention, The Journal of Sex Research, DOI: 10.1080/00224499.2022.2113854.

¿CÓMO NEGOCIAN LAS MUJERES Y LOS HOMBRES EL SEXO EN LAS RELACIONES DE LA TERCERA EDAD? UN ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS DATOS DEL ESTUDIO LONGITUDINAL INGLÉS SOBRE EL ENVEJECIMIENTO (2)

HOW DO WOMEN AND MEN NEGOTIATE SEX IN LATER LIFE RELATIONSHIPS? A QUALITATIVE ANALYSIS OF DATA FROM THE ENGLISH LONGITUDINAL STUDY OF AGING

Hayley James, James Nazroo, Georgia Chatzi and Paul Simpson.

Publicación: The Journal of Sex Research.

DOI: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00224499.2022.2112934>


Cita completa: Hayley James, James Nazroo, Georgia Chatzi & Paul Simpson (2022) How Do Women and Men Negotiate Sex in Later Life Relationships? A Qualitative Analysis of Data from the English Longitudinal Study of Aging, The Journal of Sex Research,

RESUMEN DEL ARTÍCULO

Antecedentes: las relaciones sexuales en la tercera edad, especialmente el papel del sexo, han sido descuidadas a causa de los estereotipos y las suposiciones de decadencia y falta de sexo.

Objetivo: este artículo pretende contrastar la premisa de si son ciertos estos estereotipos, examinando los guiones sexuales dentro del contexto sociocultural de las relaciones en la tercera edad.

Método: se recogieron 1.987 sujetos, mayores de 50 años en Inglaterra. Se pasaron unas encuestas que incluyen tanto preguntas estructuradas como un cuadro de comentario abierto, por si quieren comentar algo más relevante de su vida sexual. Los cuestionarios iban sobre las actitudes se-



xuales, el funcionamiento sexual y las actividades sexuales (definidas en sentido amplio para incluir actividades como el coito, así como la masturbación, las caricias u otros aspectos relevantes).

Resultados: los resultados de la investigación afirman que el sexo sigue siendo parte integral de la intimidad en las relaciones de la tercera edad para muchos hombres y mujeres de la tercera edad. Sin embargo, también muestra que la edad y el género influyen en la actividad sexual. Se contrarrestan los estereotipos de la decadencia, subrayan la importancia del sexo para muchas personas mayores, a la vez que ponen de relieve los retos específicos a los que se enfrentan las relaciones en la tercera edad.

Conclusión: la investigación ofrece contribuciones teóricamente importantes y también tiene implicaciones para la mejor manera de apoyar a los hombres y mujeres mayores en la vida posterior, necesitando un mayor reconocimiento del papel que las normas de género y edad juegan en la configuración de las experiencias de las relaciones íntimas en la vida posterior.

2. Hayley James, James Nazroo, Georgia Chatzi & Paul Simpson (2022) How Do Women and Men Negotiate Sex in Later Life Relationships? A Qualitative Analysis of Data from the English Longitudinal Study of Aging, The Journal of Sex Research, DOI: 10.1080/00224499.2022.2112934.
- 3.

PREGUNTAS SOBRE "PROSTITUCIÓN", "TRABAJO SOCIAL" Y "SEXO TRANSACCIONAL": REDACCIÓN DE PREGUNTAS Y ACTITUDES HACIA EL COMERCIO DE SERVICIOS SEXUALES (3)

ASKING ABOUT "PROSTITUTION", "SEX WORK" AND "TRANSACTIONAL SEX": QUESTION WORDING AND ATTITUDES TOWARD TRADING SEXUAL SERVICES

Michael A. Hansen y Isabelle Johansson.

Publicación: The Journal of Sex Research.

DOI: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00224499.2022.2130859?src=>

Cita completa: Michael A. Hansen & Isabelle Johansson (2022) Asking About "Prostitution", "Sex Work" and "Transactional Sex": Question Wording and Attitudes Toward Trading Sexual Services, The Journal of Sex Research.


RESUMEN DEL ARTÍCULO:

Antecedentes: a raíz del debate académico y público sobre las ventajas y desventajas de usar un concepto sobre otro al describir el comercio de servicios sexuales, se ha querido investigar cómo las opiniones sobre el comercio sexual son susceptibles de cuestionar la elección de palabras.

Objetivo: el objetivo de este artículo es investigar el impacto de la redacción de preguntas en las actitudes hacia el comercio de los servicios sexuales.

Método: mediante una encuesta original, se han evaluado, como tres conceptos distintos (prostitución, trabajo sexual y sexo transaccional) utilizados para representar el comercio de servicios sexuales podrían afectar las opiniones sobre la aceptabilidad de la actividad. Además, se estimaron modelos de regresión múltiple para probar si las variables independientes tenían efectos contrastantes en la predicción de la aceptabilidad del comercio de servicios sexuales según el concepto utilizado en la pregunta de la encuesta.

Resultados: los resultados indicaron que la prostitución es una palabra estigmatizada, que resuena más negativamente entre los encuestados en comparación con el trabajo sexual o el sexo transaccional. Cuando se les preguntó sobre el sexo transaccional, los encuestados tenían menos probabilidades de traducir una actitud en una evaluación de aceptabilidad, lo que indica que el término es débil. El trabajo



sexual suscitó respuestas más neutrales sobre la aceptabilidad. Los resultados sugieren que trabajo sexual sería el término más útil para usar en el diálogo y debate sobre el comercio de servicios sexuales.

Conclusión: los hallazgos demuestran que la redacción de las preguntas de la encuesta y/o el marco de la política pueden tener un impacto considerable en la proporción de los participantes que apoyan una política determinada.

4. Michael A. Hansen & Isabelle Johansson (2022) Asking About "Prostitution", "Sex Work" and "Transactional Sex": Question Wording and Attitudes Toward Trading Sexual Services, *The Journal of Sex Research*.

APEGO INSEGURO Y SATISFACCIÓN SEXUAL. UN MODELO DE ANÁLISIS DE TRAYECTORIA QUE INTEGRA EL MINDFULNESS SEXUAL, ANSIEDAD SEXUAL Y LA AUTOESTIMA SEXUAL (4)

INSECURE ATTACHMENT AND SEXUAL SATISFACTION: A PATH ANALYSIS MODEL INTEGRATING SEXUAL MINDFULNESS, SEXUAL ANXIETY, AND SEXUAL SELF-ESTEEM.

Lafortune, D., Girard, M., Bolduc, R., Boislard, M. A., & Godbout, N.

Publicación: *The Journal of Sex & Marital Therapy*

DOI: <https://doi.org/10.1080/0092623X.2021.2011808>

Cita completa: Lafortune, D., Girard, M., Bolduc, R., Boislard, M. A., & Godbout, N. (2022). Insecure attachment and sexual satisfaction: A path analysis model integrating sexual mindfulness, sexual anxiety, and sexual self-esteem. *Journal of Sex & Marital Therapy*, 48(6), 535-551.

RESUMEN DEL ARTÍCULO

Antecedentes: estudios previos han encontrado una asociación positiva entre la práctica de mindfulness sexual y satisfacción sexual. A pesar de ello, el mindfulness sexual no se integra de manera generalizada en los protocolos de evaluación e intervención en sexología.

Objetivo: este estudio examina el papel intermediario de tres variables (mindfulness sexual, ansiedad sexual y autoestima sexual) en un modelo de análisis para explicar la asociación entre el apego inseguro y la satisfacción sexual.

Método: se evaluó una muestra comunitaria de 543 adultos que completó una encuesta en línea.

Resultados: los resultados respaldaron el modelo integrador hipotético, que explicó el 44,1 % de la varianza en la satisfacción sexual y presentó índices de ajuste satisfactorios.

Conclusión: este estudio sugiere que la asociación entre inseguridades de apego y menor satisfacción sexual podría explicarse parcialmente por una asociación con menor mindfulness sexual, lo que enfatiza la relevancia de examinar la capacidad de mindfulness sexual durante la detección y el tratamiento de personas que presentan baja satisfacción sexual.

5. Lafortune, D., Girard, M., Bolduc, R., Boislard, M. A., & Godbout, N. (2022). Insecure attachment and sexual satisfaction: A path analysis model integrating sexual mindfulness, sexual anxiety, and sexual self-esteem. *Journal of Sex & Marital Therapy*, 48(6), 535-551.

RESULTADOS DE LA TERAPIA CONTRA EL VAGINISMO EVALUADOS POR FRECUENCIA DE RELACIONES SEXUALES CON PENETRACIÓN, SÍNTOMAS PSIQUIÁTRICOS Y SATISFACCIÓN CONYUGAL (5)

OUTCOMES OF VAGINISMUS THERAPY ASSESSED BY PENETRATIVE INTERCOURSE, PSYCHIATRIC SYMPTOMS, AND MARITAL SATISFACTION.

S. Eserdag, M.E. Akgun, F.S. Gurbuz.


Publicación: *Journal of Sex & Marital Therapy*.

DOI: <https://doi.org/10.1080/0092623X.2022.2127384>

Cita completa: Eserdag, S., Ezberci Akgün, M., & Şükrü Gürbüz, F. (2022). Outcomes of Vaginismus Therapy Assessed by Penetrative Intercourse, Psychiatric Symptoms, and Marital Satisfaction. *Journal of Sex & Marital Therapy*, 1-8.

RESUMEN DEL ARTÍCULO:

Antecedentes: el vaginismo consiste en un espasmo de los músculos que rodean la vagina y que ocurre en contra de la voluntad de la persona. Estos espasmos interfieren de manera negativa en la calidad de vida del paciente que la padece, sobre todo durante la actividad sexual con su pareja.



Objetivo: el objetivo de este estudio es evaluar los resultados de tratamiento de pacientes con vaginismo primario en una clínica especializada.

Método: N=23. Se emplearon terapias cognitivo-conductuales, ejercicios con los dedos y dilatadores vaginales. Además, como estudio pre-post se aplicó la prueba Symptom Checklist 90, MAI (Marital Adjustment Inventory) y FSFI (Female Sexual Function Index)

Resultados: todos los pacientes lograron tener relaciones sexuales al finalizar el tratamiento. Además, en general se obtuvieron mejoras significativas en los síntomas que mostraron al iniciar el tratamiento así como mejoraron los índices de función sexual de los participantes. Las puntuaciones de ajuste marital no se vieron afectadas por el tratamiento.

Conclusión: los resultados obtenidos en este estudio resaltan la importancia de incluir, dentro de un tratamiento multidisciplinar en una terapia sexual, el componente psicológico.

6. Eserdag, S., Ezberci Akgün, M., & Şükrü Gürbüz, F. (2022). Outcomes of Vaginismus Therapy Assessed by Penetrative Intercourse, Psychiatric Symptoms, and Marital Satisfaction. *Journal of Sex & Marital Therapy*, 1-8.

FUNCIÓN SEXUAL Y COMPORTAMIENTO DE BÚSQUEDA DE AYUDA TRAS EL PARTO: UN ESTUDIO TRANSVERSAL(6)

SEXUAL FUNCTION AND HELP-SEEKING BEHAVIORS FOLLOWING CHILDBIRTH: A CROSS- SECTIONAL STUDY

E.L. Kelley, D. Sheyn, A. Hijaz, S.A. Kingsberg, & R.J. Pope.

Publicación: *Journal of Sex & Marital Therapy*.

DOI: <https://doi.org/10.1080/0092623X.2022.2117747>

Cita completa: Kelley, E. L., Sheyn, D., Hijaz, A., Kingsberg, S. A., & Pope, R. J. (2022). Sexual Function and Help-Seeking Behaviors following Childbirth: A Cross-Sectional Study. *Journal of Sex & Marital Therapy*, 1-11.

RESUMEN DEL ARTÍCULO

Antecedentes: el hecho de dar a luz supone un gran cambio para la mujer a todos los niveles. Estos cambios ocurren tanto a nivel físico como psicológico y afecta, entre otras

funciones, a la sexualidad. Según diversos estudios realizados durante el período de postparto, han reportado que un amplio porcentaje de mujeres con problemas asociados a esta etapa de postparto, no piden ayuda o consultan con un profesional puesto que lo consideran como "normal".


Objetivo: el objetivo de este estudio es analizar los cambios en el funcionamiento sexual de mujeres justo después de dar a luz y en el caso de necesitarlo, qué tipo de ayuda se ha buscado para solucionarlo.

Método: N=573. La muestra se compone de mujeres residentes de Estados Unidos que completaron una encuesta online.

Resultados: la mayoría de las mujeres reportaron una disminución del deseo y/o excitación sexual. Entre las mujeres que reportaron una disminución, la mayoría no buscó ayuda de manera oficial o a través de profesionales de la salud. De aquellas mujeres que sí que consultaron con un profesional, sólo la mitad afirmaron haber recibido un tratamiento útil. A su vez, el grupo de mujeres que reportaron disminución de la función sexual y no acudieron a consulta, reportaron un mayor impacto negativo percibió del embarazo.

Conclusión: los resultados obtenidos resaltan la importancia de hacer un seguimiento, no solo al bebé sino también a las mujeres en la etapa postparto. Además, este estudio asocia la ausencia de petición de ayuda con una percepción del embarazo muy negativa.

7. Kelley, E. L., Sheyn, D., Hijaz, A., Kingsberg, S. A., & Pope, R. J. (2022). Sexual Function and Help-Seeking Behaviors following Childbirth: A Cross-Sectional Study. *Journal of Sex & Marital Therapy*, 1-11.
- 8.



LA EFICACIA DE INTERVENCIONES BASADAS EN MINDFULNESS EN ESTADOS EMOCIONALES DE MUJERES BAJO TRATAMIENTOS DE FERTILIDAD: UN METAANÁLISIS (7)

THE EFFECTIVENESS OF MINDFULNESS-BASED INTERVENTION ON EMOTIONAL STATES OF WOMEN UNDERGOING FERTILITY TREATMENT: A META-ANALYSIS.

X. Wang & Y. Wang.

Publicación: *Journal of Sex & Marital Therapy*.

DOI: <https://doi.org/10.1080/0092623X.2022.2109542>

Cita completa: Wang, X., & Wang, Y. (2022). The Effectiveness of Mindfulness-Based Intervention on Emotional States of Women Undergoing Fertility Treatment: A Meta-Analysis. *Journal of Sex & Marital Therapy*, 1-10.

RESUMEN DEL ARTÍCULO

Antecedentes: para muchas mujeres con problemas de fertilidad, su incapacidad para cumplir con sus aspiraciones y las expectativas de la sociedad sobre la maternidad son un claro factor predisponente de trastornos mentales. En este aspecto, la fecundación in vitro, supone una solución a la vez que se convierte en un nuevo factor de estrés multidimensional para la mujer. El mindfulness, es uno de los numerosos tratamientos eficaces para el estrés, sin embargo, todavía hay estudios que discuten su eficacia.

Objetivo: el objetivo de este estudio es evaluar la eficacia de un tratamiento de mindfulness sobre el estado emocional de mujeres sometidas a una fertilización in vitro.

Método: se realizó un metaanálisis basado en los motores de búsqueda más usados y sin emplear ningún límite de fecha. Se incluyeron 6 estudios con datos de un total de 964 mujeres.

Resultados: los resultados del metaanálisis mostraron que el mindfulness fue más eficaz que el grupo control para reducir la ansiedad y depresión en las pacientes. En términos de atención plena y autocompasión no hubo diferencias significativas.

Conclusión: los resultados obtenidos en este estudio aportan una evidencia más de la eficacia del tratamiento

de mindfulness para tratar la ansiedad y depresión sobre el estado emocional de la paciente.

9. Wang, X., & Wang, Y. (2022). The Effectiveness of Mindfulness-Based Intervention on Emotional States of Women Undergoing Fertility Treatment: A Meta-Analysis. *Journal of Sex & Marital Therapy*, 1-10.

DATOS NORUEGOS SOBRE PREVALENCIA, COMPORTAMIENTOS SEXUALES DE RIESGO, PROBLEMAS SEXUALES Y SATISFACCIÓN SEXUAL EN HOMBRES QUE TIENEN SEXO EXCLUSIVAMENTE CON MUJERES, HOMBRES QUE TIENEN SEXO EXCLUSIVAMENTE CON HOMBRES Y HOMBRES QUE TIENEN SEXO CON HOMBRES Y MUJERES (8)

NORWEGIAN DATA ON PREVALENCE, SEXUAL RISK BEHAVIORS, SEXUAL PROBLEMS, AND SEXUAL SATISFACTION IN MEN WHO HAVE SEX EXCLUSIVELY WITH WOMEN, MEN WHO HAVE SEX EXCLUSIVELY WITH MEN, AND MEN WHO HAVE SEX WITH MEN AND WOMEN.

Træen, B., Fischer, N., & Grøndahl, P.


Publicación: *International Journal of Sexual Health*.

DOI: <https://doi.org/10.1080/19317611.2022.2126056>

Cita completa: Træen, B., Fischer, N., & Grøndahl, P. (2022). Norwegian Data on Prevalence, Sexual Risk Behaviors, Sexual Problems, and Sexual Satisfaction in Women Who Have Sex Exclusively with Women, Women Who Have Sex Exclusively with Men, and Men Who Have Sex with Men and Women. *International Journal of Sexual Health*, 1-15.

RESUMEN DEL ARTÍCULO

Antecedentes: gran parte de la literatura que estudia las minorías sexuales tiene un enfoque biomédico centrado en conocer los factores de riesgo sexual asociados a las enfermedades de transmisión sexual (ETS). Las nuevas miradas sugieren un enfoque más amplio centrado en el placer sexual que puede ser más beneficioso y que incluiría a las minorías sexuales. Por lo que el estudio de la salud sexual ha de abordar temáticas como el placer y el bienestar además de los factores de riesgo y las ETS.



Objetivo: el objetivo de este estudio fue investigar cómo hombres que quieren tener sexo exclusivamente con mujeres (MSEW) difieren de hombres que quieren tener sexo exclusivamente con hombres (MSEM), y hombres que quieren tener sexo con hombres y mujeres (MSMW).

Método: 2,181 hombres fueron divididos en 4 subgrupos: sin relaciones sexuales, MSEW, MSEM y MSMW. Así mismo también se evaluó la orientación sexual (heterosexual, gay, bisexual/pansexual, asexual y otros). Se evaluó también a la influencia de la pornografía, la satisfacción sexual y dificultades sexuales.

Resultados: la mayoría de MSEW se consideraron como heterosexuales, la mayoría de MSEM como homosexuales y la mayoría de MSMW como heterosexuales. Además, los MSMW reflejaron el mayor número de parejas sexuales y la menor tendencia al uso de condón. Los MSEW y MSMW tenían mayor tendencia a la eyaculación precoz que los MSEM.

Conclusión: este estudio revela que los MSMW debería ser incluidos en las campañas de promoción y prevención de la salud sexual para mejorar la salud sexual en los grupos de orientación sexual minoritaria.

10. Træen, B., Fischer, N., & Grøndahl, P. (2022). Norwegian Data on Prevalence, Sexual Risk Behaviors, Sexual Problems, and Sexual Satisfaction in Women Who Have Sex Exclusively with Women, Women Who Have Sex Exclusively with Men, and Women Who Have Sex with Men and Women. *International Journal of Sexual Health*, 1-15.

EL PAPEL DEL RACISMO Y EL SEXISMO EN LAS ACTITUDES HACIA EL ABORTO ENTRE PERSONAS BLANCAS, LATINAS Y NEGRAS (9)

THE ROLE OF RACISM AND SEXISM IN ATTITUDES TOWARDS ABORTION AMONG WHITE, LATINX, AND BLACK INDIVIDUALS.

Baker, M. R., McClelland, S. I., & Jozkowski, K. N.

Publicación: Sex Roles.

DOI: <https://doi.org/10.1007/s11199-022-01328-8>

Cita completa: Baker, M. R., McClelland, S. I., & Jozkowski, K. N. (2022). The Role of Racism and Sexism in Attitudes Towards Abortion Among White, Latinx, and Black Individuals. *Sex Roles*, 1-20.

RESUMEN DEL ARTÍCULO

Antecedentes: las posturas respecto al aborto juegan un papel significativo en la política contemporánea estadounidense. Investigaciones anteriores han documentado la influencia del racismo y el sexismo en las posturas políticas de los estadounidenses. Sin embargo el papel de las creencias individuales sobre el racismo y el sexismo han estado ausentes en estudios científicos relacionados con el aborto.


Objetivo: el objetivo del estudio fue identificar la posible relación existente entre el racismo y el sexismo, originado por estereotipos históricamente arraigados, con las creencias sobre el aborto.

Método: se buscó completar una encuesta en línea que evalúa las actitudes hacia el aborto, el racismo simbólico, el sexismo moderno y la religiosidad. La muestra se dividió por raza negros (n = 401), latinos (n = 316) y blancos (n = 343). Para evaluar el racismo simbólico se utilizó la 8-item Symbolic Racism 2000 Scale. Para la evaluación del sexismo se utilizó 8-item Modern Sexism Scale. La valoración de la afinidad religiosa se evalúa mediante cuatro preguntas que evaluaban las creencias religiosas, la doctrina profesada y la importancia de la religión. La actitud hacia el aborto se midió utilizando 8 preguntas del Trends in public attitudes towards abortion.

Resultados: los resultados reflejando que la antipatía hacia la igualdad de los afroamericanos o de las mujeres correlacionaba con una oposición al aborto; por encima de la religiosidad y en cualquiera de los tres subgrupos. Se encontraron diferencias significativas en las comparaciones una a una de todas las variables: oposición fuerte al aborto, opción leve la aborto, racismo simbólico, sexismo moderno, cristianos conservadores y religiosidad sin afiliación. Además se encontraron diferencias en función de la raza de los sujetos.

Conclusión: este estudio observó que las ideologías reaccionantes sobre el aborto correlacionan con ideologías machistas y racistas.

11. Baker, M. R., McClelland, S. I., & Jozkowski, K. N. (2022). The Role of Racism and Sexism in Attitudes Towards Abortion Among White, Latinx, and Black Individuals. *Sex Roles*, 1-20.



ALTERACIONES EN LA SEXUALIDAD DE MUJERES INTERVENIDAS DE CISTECTOMÍA RADICAL (10)

SEXUAL DYSFUNCTIONS IN WOMEN AFTER RADICAL CYSTECTOMY.

Mellado Castellero Alejandro, Sánchez Alcántara MB, San Martín Blanco C, Jurado López AR.

Publicación: Revista Desexología.

Cita completa: Medallo Castellero, A., Sánchez Alcántara, M., San Martín Blanco, C. & Jurado López, A. (2022). Alteraciones en la sexualidad de mujeres intervenidas de cistectomía radical. *Desexología*, 11.

RESUMEN DEL ARTÍCULO

Antecedentes: el cáncer vesical es una patología frecuente a nivel mundial, y su tratamiento estándar es la cistectomía radical. Diversos estudios respaldan la evidencia de los efectos negativos en la sexualidad de pacientes intervenidas de ello, debido a la extirpación vesical que incluye la extirpación del útero y parte de la vagina. En la literatura existen estudios de cohortes pequeñas.

Objetivo: el propósito de este estudio es analizar los efectos negativos en la sexualidad de pacientes intervenidas de cistectomía radical demostrando las disfunciones sexuales más frecuentes observadas en una cohorte de mujeres y posteriormente comparándolo con la literatura científica.

Metodología: N=30. Se comenzó con una muestra de 30 pacientes iniciales y el estudio acabó con sólo 5 de ellas. El proceso consistió en la realización de una entrevista presencial personalizada en la que se cumplimentó el "Cuestionario de Función Sexual de la Mujer" (FSM-2) y una pregunta extra acerca de si percibieron cambios en su funcionamiento sexual tras la intervención.

Resultados: en cuanto a los resultados obtenidos, el 60% de las pacientes no presentaron actividad sexual en las 4 últimas semanas. Los resultados del FSM-2 demuestran un 40% de las pacientes fueron catalogadas con disfunción severa del deseo, excitación y lubricación. Además, un 20% presentaba disfunción severa de la penetración vaginal por presencia de dolor y otro 20% disfunción severa del orgasmo. Se observa entre los resultados de las pacientes ansiedad anticipatoria ante un encuentro sexual. Por último, con respecto a la pregunta extra acerca de cambios en su funcionamiento sexual tras la intervención, el 100% refieren cambios.

Conclusiones: la neoplasia vesical es una patología frecuente que repercute de manera considerable en el paciente con respecto a todas las fases de respuesta sexual, así como para la autopercepción corporal de la persona y sus relaciones interpersonales. A pesar de obtener una cohorte pequeña durante el estudio, se puede observar la similitud en cuanto a los hallazgos encontrados en la literatura científica.

12. Medallo Castellero, A., Sánchez Alcántara, M., San Martín Blanco, C. & Jurado López, A. (2022). Alteraciones en la sexualidad de mujeres intervenidas de cistectomía radical. *Desexología*, 11.

SEXUALIDAD. GÉNERO Y PATOLOGÍAS MENTALES (11)

SEXUALITY, GENDER AND MENTAL PATHOLOGIES.

José Manuel Bertolín Guillén.

Publicación: Revista Desexología.

Cita Completa: Bertolín Guillén, J. (2022). Sexualidad. Género y patologías mentales. *Desexología*, 11.


RESUMEN DEL ARTÍCULO

Antecedentes: se plantea la concurrencia de la relación entre sexualidad y género de las personas con cualquier morbilidad psicopatológica. La identidad de género, el rol de género y el transgénero son conceptos distintos que debemos saber diferenciar ya que tienen su importancia en la común y trascendente conjunción de la salud mental de la persona. Además, no solo puede haber relación entre género y psicopatología, sino que habrá que tener en cuenta que la salud mental de los progenitores puede influir en sus descendientes de manera transgeneracional.

Objetivo: el objetivo de este estudio es profundizar y contribuir a esclarecer la interrelación para una misma persona entre su sexo, identidad de género y estado de salud o patología mental.

Método: investigación práctica, de manera breve y sintética de la literatura científica, de calidad y reciente para elucidar qué vínculos existen o pueden existir entre sexo, género y ciertos trastornos mentales.

Resultados: durante la investigación se halló que las variantes genéticas pueden contribuir a la disforia de género y a



las identidades transgénero y de género diverso. En los casos de intersexualidad o transexualidad, al margen de posicionamientos a priori, modas o corrientes, el facultativo sanitario debe dilucidar si también coexisten patologías mentales asociadas. Además, el estigma y la salud mental de las minorías sexuales puede que les hallan involucrado en procesos de estrés y consecuentemente afecte a la salud mental.

Conclusión: como resultado de la investigación se concluye que son diferentes las morbilidades de los trastornos mentales según el sexo de los sujetos. Existe riesgo de influir en los descendientes de manera transgeneracional aquellos trastornos mentales de los progenitores. Por otro lado, en los casos en que la persona plantee dudas sobre su género o sexualidad será conveniente la evaluación correcta de su estado mental actual y anterior, y así descartar de manera conveniente trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo que pudieran estar asociados o influir en la persona.

13. Bertolín Guillén, J. (2022). Sexualidad. Género y patologías mentales. *Sexología*, 11.

PROGRAMA EDUCATIVO PARA INCREMENTAR LOS CONOCIMIENTOS SOBRE EL EMBARAZO EN ADOLESCENTES DEL CONSULTORIO 8 DEL POLICLÍNICO ISABEL RUBIO (12)

EDUCATIONAL PROGRAM TO INCREASE KNOWLEDGE ABOUT PREGNANCY IN ADOLESCENTS OF THE DOCTOR'S OFFICE NO.8 IN THE ISABEL RUBIO POLYCLINIC

Ana Bethania González Lugo, Juan Carlos Marrero García, Clara de la C. Lugo López, Carlos Rafael González Lugo.

Publicación: Revista Sexología y Sociedad.

Cita completa: Lugo, A. B. G., García, J. C. M., López, C. D. L. C. L., & Lugo, C. R. G. (2022). Programa educativo para incrementar los conocimientos sobre el embarazo en adolescentes, del CMF# 8 del Policlínico Isabel Rubio. *Revista Sexología y Sociedad*, 28(1).

RESUMEN DEL ARTÍCULO

Antecedentes: la adolescencia es una etapa crucial de la vida, en esta edad se produce una intensa formación de los

contenidos y funciones psicológicas, entre las que destaca la identidad personal. Es una etapa en la que aumentan los riesgos como relaciones sexuales e ingesta de alcohol. Al mismo tiempo que se debilita la posibilidad de control e influencia por parte del adulto, por lo que se exige que la familia se reorganice, se reestructure y se ajuste a la situación.


Objetivo: la finalidad de la investigación es brindar de recursos necesarios a través de un programa educativo a los adolescentes para que contribuyan a un aumento de conocimientos con respecto a las relaciones sexuales y los embarazos y que les permitan asumir comportamientos en pro de su salud, en el Consultorio 8 del policlínico Isabel Rubio.

Método: N=47 La investigación está dividida en dos fases. En la primera se establece un diagnóstico de los conocimientos que poseen sobre el embarazo en la adolescencia y los riesgos. En la segunda parte se diseña un Programa de Intervención Educativa, se plantea actividades, acciones y recursos para alcanzar los conocimientos necesarios en los adolescentes.

Resultados: se identificó el predominio de la soltería en el sexo femenino por lo que significa una mayor probabilidad de ser madres solteras. Además, con respecto al nivel de conocimientos sobre embarazo en adolescencia se muestran diferencias en cuanto al género, aunque a pesar de ello los conocimientos no resultan suficientes para el desarrollo de una sexualidad plena y responsable necesaria en este periodo. Además, la mayoría reconoce los métodos anticonceptivos, pero existe poca utilización, lo que constituye conductas de riesgo como embarazo o infecciones de transmisión sexual.

Conclusiones: como resultado de la investigación se determinaron variables sociodemográficas, siendo representativo el sexo femenino, entre 16 y 17 años con estado civil de soltero/a. Necesitan ser capacitados de conocimientos en riesgos físicos, psicológicos, sociales y económicos asociados a un embarazo en la adolescencia; ciclo sexual, periodo fértil; métodos anticonceptivos. Por último, se diseña un programa educativo que aborda las cuestiones mencionadas.

14. Lugo, A. B. G., García, J. C. M., López, C. D. L. C. L., & Lugo, C. R. G. (2022). Programa educativo para incrementar los conocimientos sobre el embarazo en adolescentes, del CMF# 8 del Policlínico Isabel Rubio. *Revista Sexología y Sociedad*, 28(1).



PERCEPCIONES Y RESPUESTAS EMOCIONALES DE LAS MUJERES ANTE LA VIOLENCIA SEXUAL REPRESENTADA EN PELÍCULAS O SERIES (13)

WOMEN'S PERCEPTIONS OF, AND EMOTIONAL RESPONSES TO, SEXUAL VIOLENCE DEPICTED IN FILM OR SERIES

Kierra Catherine Maika & Angela D. Weaver.

Publicación: *The Canadian Journal of Human Sexuality*, 31(2), 2022, 280-292.

DOI: <https://doi.org/10.3138/cjhs.2022-0023>

Cita completa: Maika, K. C. & Weaver, A. D. (2022). Women's perceptions of, and emotional responses to, sexual violence depicted in film or series. *The Canadian Journal of Human Sexuality*, 31(2), 280-292. <https://doi.org/10.3138/cjhs.2022-0023>

RESUMEN DEL ARTÍCULO

Antecedentes: la violencia sexual, particularmente contra las mujeres, es alarmantemente común. Muchas supervivientes experimentan trastorno de estrés postraumático. Por lo tanto, los recuerdos del trauma pueden causar flashbacks, síntomas disociativos y miedo intenso, entre otros. Por otro lado, en los medios se muestra regularmente violencia sexual, lo que podría causar angustia y activar estos síntomas mencionados.

Objetivo: el objetivo del estudio es examinar las percepciones y las respuestas emocionales de las mujeres a las escenas de violencia sexual presentes en películas y/o series.

Método: participaron un total de 229 mujeres: más de la mitad (52%) informaron que habían experimentado violencia sexual. Todas (n=229) completaron una encuesta en línea.

Resultados: las participantes informaron de percepciones negativas de las escenas de violencia sexual, viéndolas como demasiado gráficas, usadas para impactar/excitar e innecesarias para la trama. Las mujeres que tenían antecedentes de haber sufrido violencia sexual reportaron una mayor evitación de los medios que pudieran contener escenas de violencia sexual y un mayor afecto negativo en respuesta a ellas. Sin embargo, las mujeres que pasaron el punto de corte de detección del trastorno de estrés postraumático no informaron mayor evitación y afecto negativo que en aquellas que no excedieron el límite. Por último, aquellas que informaron una

mayor tendencia a hacer frente a los factores estresantes utilizando la evitación, informaron mayor evitación y afecto negativo en respuesta a escenas de violencia sexual.

Conclusión: la asociación demostrada entre la historia de violencia sexual y la experiencia de afecto negativo y evitación no es sorprendente dado que se ha encontrado que las mujeres informan más síntomas de reexperimentación y perturbación en comparación con los hombres, y que los síntomas de perturbación, evitación y reexperimentación fueron más altos para las supervivientes de agresiones sexuales que para cualquier otro tipo de trauma evaluado. Los futuros estudios deberían preguntar a las mujeres, especialmente a aquellas que son sobrevivientes de violencia sexual, cómo les gustaría que se representara el tema de la violencia sexual en películas y series.

15. Maika, K. C. & Weaver, A. D. (2022). Women's perceptions of, and emotional responses to, sexual violence depicted in film or series. *The Canadian Journal of Human Sexuality*, 31(2), 280-292. <https://doi.org/10.3138/cjhs.2022-0023>

¿EL ACOSO POR PARTE DE COMPAÑEROS/ AS EN LA JUVENTUD ESTÁ RELACIONADO CON LA DEPRESIÓN SEXUAL EN LA EDAD ADULTA? UN MODELO DE MEDIACIÓN DE LA VERGÜENZA, LA ANSIEDAD SOCIAL Y LA SATISFACCIÓN CORPORAL? (14)

IS BULLYING BY PEERS IN YOUTH RELATED TO SEXUAL DEPRESSION IN ADULTHOOD? A MEDIATION MODEL OF SHAME, SOCIAL ANXIETY, AND BODY SATISFACTION

Matvei Morozov & Marie-Aude Boislard.


Publicación: *The Canadian Journal of Human Sexuality*.

DOI: <https://doi.org/10.3138/cjhs.2022-0022>

Cita completa: Morozov, M. & Boislard, M. A. (2022). Is bullying by peers in youth related to sexual depression in adulthood? A mediation model of shame, social anxiety, and body satisfaction. *The Canadian Journal of Human Sexuality*, 31(2), 217-230.

RESUMEN DEL ARTÍCULO

Antecedentes: en los últimos años, el placer y el bienestar sexual han sido reconocidos como derechos humanos



fundamentales y explícitamente afirmados como tales por la Asociación Mundial para la Salud Sexual. El placer sexual juega un papel importante en el bienestar subjetivo general, teniendo implicaciones importantes para la salud pública y siendo un componente clave en la satisfacción sexual.

Este estudio se centra en la depresión sexual, un tema relativamente poco estudiado para el bienestar sexual. Este término se define como "la experiencia de sentimientos de depresión con respecto a la vida sexual de uno" y "una tendencia a culparse a uno mismo sobre la incapacidad para relacionarse sexualmente con otro individuo". Debido a que la depresión sexual se enfoca en fuentes intrapersonales de afecto negativo, este constructo es interesante para estudiar como una posible consecuencia de adversidades experimentadas personalmente, como ser acosado en la juventud.

Objetivo: examinar si el acoso por parte de compañeros/as en la infancia y adolescencia está asociado con la depresión sexual en la edad adulta y, si esta relación está mediada por la vergüenza, ansiedad social y/o la insatisfacción corporal y, a su vez, moderada por el género.

Método: Participaron un total de 1210 adultos (44,8 % hombres cisgénero, 47,9 % mujeres cisgénero, 7,3 % otros géneros) con una media de edad de 27,07 años que completaron un cuestionario en línea sobre diversas experiencias sexuales y de vida.

Resultados: el bullying se asoció positivamente con la vergüenza y negativamente con la satisfacción corporal. Además, la vergüenza, la ansiedad social y la insatisfacción de la parte inferior del cuerpo se asociaron positivamente con la depresión sexual. La vergüenza se asoció más fuertemente con la depresión sexual en los hombres cisgénero que en las mujeres cisgénero. En conjunto, la vergüenza, la ansiedad social y la baja satisfacción corporal mediaron la relación entre la incidencia de acoso escolar en la juventud y la depresión sexual en la edad adulta.

Conclusión: este estudio es un primer paso para comprender la posible relación entre ser intimidado por compañeros/as en la infancia y la juventud y los sentimientos de depresión sexual en la edad adulta. Si estos hallazgos se confirman en estudios futuros que aborden dichas limitaciones, sobre todo mediante el uso de una medida más integral del bullying en un diseño longitudinal, podrían tener implicaciones potencialmente importantes para la política social y la intervención psicológica. Esto destaca la importancia continua de implementar medidas más estrictas contra el

acoso escolar en las escuelas y otros contextos. Este estudio también podría tener implicaciones importantes para llevar a cabo la terapia con clientes que informan sentimientos de insuficiencia y depresión con respecto a su vida sexual o su capacidad percibida para ser una buena pareja sexual. El conocimiento de predictores específicos de la depresión sexual permitiría al terapeuta evaluar mejor los procesos cognitivos y emocionales detrás de estas dificultades sexuales, lo que le proporcionaría una visión más clara de cómo desafiar y elaborar estas cogniciones.

16. Morozov, M. & Boislard, M. A. (2022). Is bullying by peers in youth related to sexual depression in adulthood? A mediation model of shame, social anxiety, and body satisfaction. *The Canadian Journal of Human Sexuality*, 31(2), 217-230. <https://doi.org/10.3138/cjhs.2022-0022>

¿QUÉ SIGNIFICA RESPONDER A LAS NECESIDADES SEXUALES DE UNA PAREJA? HACIA UNA DEFINICIÓN DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA A LA NECESIDAD SEXUAL(15)

WHAT DOES IT MEAN TO BE RESPONSIVE TO A PARTNER'S SEXUAL NEEDS? TOWARD A DEFINITION OF SEXUAL NEED RESPONSIVENESS

Laura M. Vowels, Carla A. Roos, Jasmina Mehulic, Siobhan M. O'Dean & M. Dolores Sánchez-Hernández


Publicación: Archives of Sexual Behavior.

DOI: <https://doi.org/10.1007/s10508-022-02432-2>

Cita completa: Vowels, L. M., Roos, C. A., Mehulic, J., O'Dean, S. M. & Sánchez-Hernández, M. D. (2022). What Does It Mean to Be Responsive to a Partner's Sexual Needs? Toward a Definition of Sexual Need Responsiveness. *Archives of Sexual Behavior*, 51(8), 3735-3747.

RESUMEN DEL ARTÍCULO:

Antecedentes: en la actualidad muchas parejas esperan que sus relaciones brinden no solo amor y cuidados, sino también un espacio para la autoexpansión, el crecimiento y la satisfacción de las necesidades sexuales. Puede que las personas satisfagan algunas de sus necesidades de crecimiento, emocionales y sociales fuera de la relación de pareja. Sin embargo, la mayoría de las relaciones románticas son



sexualmente monógamas, lo que significa que la mayoría de las parejas dependen exclusivamente el uno del otro para satisfacer sus necesidades sexuales.

La falta de reconocimiento y satisfacción de las necesidades sexuales de una pareja podría resultar en una menor intimidad sexual, conflicto e insatisfacción dentro de la relación, lo que podría aumentar la probabilidad de ponerle fin a la relación. Esto destaca la importancia de que las parejas sean sexualmente receptivas dentro de las relaciones para satisfacer las necesidades sexuales de cada uno.

Objetivo: investigaciones anteriores se han centrado en definiciones dirigidas por investigadores de la capacidad de respuesta a las necesidades sexuales, por tanto, el propósito del presente estudio fue desarrollar una definición informada por los participantes de la capacidad de respuesta a la necesidad sexual.

Método: un total de 305 personas (principalmente mujeres) respondieron a cinco preguntas abiertas sobre la definición y los comportamientos relacionados con la capacidad de respuesta a las necesidades sexuales.

Resultados: hubo un total de siete temas principales: comunicación verbal, escuchar señales verbales y no verbales, acomodación, concesión, respeto, experimentación y satisfacción mutua. Los resultados del análisis de contenido mostraron que los elementos más comunes en la definición de los participantes incluían: escuchar y adaptarse a las necesidades y deseos del otro, y actuar de acuerdo con esas necesidades y deseos siempre que fuera posible, respetando la seguridad y los límites de ambos.

Conclusión: comunicarse abierta y honestamente y escuchar señales tanto verbales como no verbales fue una forma importante de establecer las necesidades sexuales en las relaciones y permitió que las parejas respondieran sexualmente. La satisfacción mutua parecía usarse como una medida de éxito en la respuesta sexual. El estudio amplió la definición y comprensión de la capacidad de respuesta a las necesidades sexuales y destacó los beneficios de preguntar directamente a los participantes qué significan para ellos los constructos definidos anteriormente. Esto puede agregar información adicional para los investigadores.

17. Vowels, L. M., Roos, C. A., Mehulić, J., O'Dean, S. M. & Sánchez-Hernández, M. D. (2022). What Does It Mean to Be Responsive to a Partner's Sexual Needs? Toward a Definition of Sexual Need Responsiveness. *Archives of Sexual Behavior*, 51(8), 3735-3747. <https://doi.org/10.1007/s10508-022-02432-2>

FRECUENCIA EN LAS RELACIONES SEXUALES DURANTE EL EMBARAZO: ENCUESTAS SEMANALES EN 237 MUJERES JÓVENES EN UNA POBLACIÓN ALEATORIZADA (16)

SEXUAL INTERCOURSE FREQUENCY DURING PREGNANCY: WEEKLY SURVEYS AMONG 237 YOUNG WOMEN FROM A RANDOM POPULATION-BASED SAMPLE

Blumenstock, S. M., & Barber, J. S.

Publicación: The Journal of Sexual Medicine.

DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jsxm.2022.07.006>

Cita completa: Blumenstock, S. M., & Barber, J. S. (2022). Sexual Intercourse Frequency During Pregnancy: Weekly Surveys Among 237 Young Women from A Random Population-Based Sample. *The Journal of Sexual Medicine*, 19(10), 1524-1535.


RESUMEN DEL ARTÍCULO

Antecedentes: se han documentado diferencias significativas en la frecuencia sexual durante el embarazo en estudios transversales y longitudinales de una vez por trimestre, con la mayor frecuencia sexual en el primer trimestre y la menor en el tercero. Sin embargo, los cambios en la frecuencia sexual pueden ser más complejos de lo que sugieren estas comparaciones; no se han evaluado los patrones de frecuencia sexual mediante evaluaciones frecuentes (por ejemplo, semanales) a lo largo del embarazo de una mujer.

Objetivo: evaluar los cambios en la frecuencia de las relaciones sexuales a lo largo de todas las semanas del embarazo.

Método: se utilizaron datos de 237 mujeres (54% blancas; 43% negras) que declararon un embarazo durante el estudio Relationship Dynamics and Social Life (RDSL). El RDSL se basó en una muestra aleatorizada basada en la población de 992 mujeres en los Estados Unidos, de 18 o 19 años de edad, que completaron una entrevista de referencia y breves encuestas semanales de seguimiento durante 2,5 años. Se utilizó un modelo multinivel generalizado para ajustar y comparar modelos lineales, cuadráticos y a trozos (mediante b-splines).

Resultados: la frecuencia de las relaciones sexuales disminuyó claramente a lo largo del embarazo, aunque el patrón



siguió el curso de la sintomatología común del embarazo (es decir, náuseas, fatiga) más estrechamente que los límites trimestrales. El modelo que mejor se ajustaba demostró que la probabilidad de tener relaciones sexuales disminuía bruscamente (18% cada semana) entre la concepción y las 11 semanas, posteriormente aumentaba en 3% cada semana entre las semanas 11 y 21, y luego disminuía constantemente (6% cada semana) hasta el final del embarazo.

Conclusión: los cambios en la frecuencia sexual son más complejos que los descensos generales sugeridos por otros estudios; los patrones dentro del trimestre revelan las deficiencias en la comprensión de los cambios de la conducta sexual cuando se agregan por trimestre, como la grave subestimación del grado de fluctuación en el primer trimestre. La sintomatología del embarazo puede ser más favorable a las relaciones sexuales hacia el final del primer y el principio del segundo trimestre, y menos favorable cerca del final del embarazo.

18. Blumenstock, S. M., & Barber, J. S. (2022). Sexual Intercourse Frequency During Pregnancy: Weekly Surveys Among 237 Young Women From A Random Population-Based Sample. *The Journal of Sexual Medicine*, 19(10), 1524-1535.

ASOCIACIONES TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES ENTRE LOS SÍNTOMAS DE ESTRÉS POST-TRAUMÁTICO Y COMPORTAMIENTOS HIPERSEXUALES EN INDIVIDUOS QUE HAN APOSTADO A LO LARGO DE SU VIDA (17)

CROSS-SECTIONAL AND LONGITUDINAL ASSOCIATIONS BETWEEN POSTTRAUMATIC STRESS SYMPTOMS AND HYPERSEXUAL BEHAVIORS AMONG INDIVIDUALS WHO HAVE GAMBLLED IN THEIR LIFETIMES

Rosansky, J. A., Borgogna, N. C., Kraus, S. W., & Grubbs, J. B

Publicación: The Journal of Sexual Medicine.

DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jsxm.2022.09.003>

Cita completa: Rosansky, J. A., Borgogna, N. C., Kraus, S. W., & Grubbs, J. B. (2022). Cross-Sectional and Longitudinal Associations Between Posttraumatic Stress Symptoms and Hypersexual Behaviors Among Individuals Who have Gambled in Their Lifetimes. *The Journal of Sexual Medicine*.

RESUMEN DEL ARTÍCULO:

Antecedentes: la exposición a experiencias traumáticas representa un factor que puede contribuir al desarrollo de comportamientos hipersexuales.

Objetivo: se investigaron las asociaciones entre los síntomas de estrés postraumático (TEPT) y las conductas hipersexuales mediante el análisis de los datos de la encuesta de 2 muestras.


Método: la primera muestra consistió en $n = 585$ estudiantes universitarios, y la segunda consistió en $n = 786$ adultos reclutados a través de Amazon's Mechanical Turk (MTurk), $n = 337$ de los cuales completaron una encuesta de seguimiento de 6 meses. Se realizaron 3 análisis de regresión jerárquica ajustando por edad, género, orientación sexual, impulsividad, consumo de drogas, consumo de alcohol y juego.

Resultados: los resultados primarios de esta investigación fueron las asociaciones entre los síntomas de estrés postraumático, medidos mediante la lista de comprobación del TEPT para el DSM-IV y el DSM-5 y los comportamientos hipersexuales, medidos mediante el Inventario de comportamientos hipersexuales (HBI).

Una regresión significativa, $R^2 = 0,230$, $R^2_{ajustada} = 0,211$, $F(14,570) = 12,17$, $P < 0,001$, reveló que los síntomas de estrés postraumático estaban asociados con las conductas hipersexuales en la muestra de estudiantes universitarios ($\beta = 0,154$). Una regresión significativa utilizando la muestra de MTurk, $R^2 = 0,403$, $R^2_{ajustado} = 0,392$, $F(14,771) = 37,13$, $P < .001$, confirmó este hallazgo ($\beta = 0,259$). Además, una regresión significativa, $R^2 = 0,562$, $R^2_{ajustada} = 0,541$, $F(15,321) = 27,42$, $P < 0,001$, indicó que los síntomas de estrés postraumático estaban asociados longitudinalmente con un aumento de las conductas hipersexuales ($\beta = 0,190$) después de ajustar todas las variables, incluida la hipersexualidad de base.

Conclusión: este estudio proporciona apoyo a la hipótesis de que los síntomas de estrés postraumático se asocian con un aumento de la conducta hipersexual, y está indicado realizar más investigaciones para explorar la etiología y la direccionalidad de esta relación.

19. Rosansky, J. A., Borgogna, N. C., Kraus, S. W., & Grubbs, J. B. (2022). Cross-Sectional and Longitudinal Associations Between Posttraumatic Stress Symptoms and Hypersexual Behaviors Among Individuals Who have Gambled in Their Lifetimes. *The Journal of Sexual Medicine*.



COMPORTAMIENTOS SEXUALES EN PAREJA Y SOLITARIO EN UNA MUESTRA INTERNACIONAL DE ADULTOS CON ESPINA BÍFIDA (18)

SOLO AND PARTNERED SEXUAL BEHAVIOR AMONG AN INTERNATIONAL SAMPLE OF ADULTS WITH SPINA BIFIDA

Hensel, D. J., Misseri, R., Wiener, J. S., Roth, J. D., Whittam, B. M., Cain, M. P., & Szymanski, K. M.

Publicación: The Journal of Sexual Medicine.

DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jsxm.2022.09.004>

Cita completa: Hensel, D. J., Misseri, R., Wiener, J. S., Roth, J. D., Whittam, B. M., Cain, M. P., & Szymanski, K. M. (2022). Solo and Partnered Sexual Behavior Among an International Sample of Adults With Spina Bifida. *The Journal of Sexual Medicine*.

RESUMEN DEL ARTÍCULO

Antecedentes: la espina bífida (EB) puede tener un impacto diferencial en la participación de los adultos en las conductas sexuales en solitario y en pareja, pero son pocos los estudios que investigan este tema.

Objetivo: describir las conductas sexuales en solitario y en pareja entre una muestra internacional de hombres y mujeres adultos con EB.

Método: los datos se extrajeron de una encuesta transversal más amplia, basada en Internet, que evaluaba los comportamientos sexuales de una muestra internacional de hombres y mujeres con EB. Se utilizó una regresión logística para examinar el impacto de los factores de fondo (género, edad, vida independiente y estado de la relación) y de salud (estado de la derivación, deambulación y sensación genital) en cada resultado.

Resultados: la muestra estaba formada por 345 encuestados de entre 18 y 73 años de 26 países. Muy pocos (<3%) no habían tenido ninguna experiencia a lo largo de su vida con ninguna conducta en solitario o en pareja; el 25,0% declaró haber participado en todas las conductas en algún momento de su vida. La mediana del número de conductas sexuales en el último año (de un total de 16) fue de 7. La participación a lo largo de la vida y la reciente se asociaron con factores demográficos y de salud.

Conclusión: a pesar de la discapacidad, muchos adultos con EB participan en conductas sexuales en solitario y en pareja. Se necesitan apoyos médicos y psicosociales para ayudar a los adultos de esta población a disfrutar de la sexualidad de forma saludable y segura.

20. Hensel, D. J., Misseri, R., Wiener, J. S., Roth, J. D., Whittam, B. M., Cain, M. P., & Szymanski, K. M. (2022). Solo and Partnered Sexual Behavior Among an International Sample of Adults With Spina Bifida. *The Journal of Sexual Medicine*.