

## EL SEMIGRUP CARACTERÍSTIC D'UN ESPAI QUOCIENT SEPARAT

Joan Tarrés i Freixenet

Dpto. de Geometría y Topología  
Universidad Complutense de Madrid

### ABSTRACT

According the definition of the characteristic semigroup of a Hausdorff topological space given by S. B. O'Reilly, we calculate the characteristic semigroup of a Hausdorff quotient space  $X/R$  for different classes of equivalence relations on  $X$ .

=====

A (2) hom defineix el semigrup caracteristic d'un espai topològic de Hausdorff  $X$  com el conjunt  $S(X) = \{A \subset X \times X ; A \text{ és tancat a } X \times X \text{ i } r(A) \text{ compacte a } X\}$  on  $r(A) = \{y \in X ; \text{ existeix } x \in X, (x,y) \in A\}$  respecte de la composició de relacions. Igualment, a (2) es prova que dos espais topològics  $T_2$  són homeomòrfes si i només si els seus semigrups característics són isomorfes.

En aquest treball hom calcula el semigrup caracteristic d'un espai topologic quocient separat  $X/R$  respecte de diferents tipus de relacions d'equivalencia sobre l'espai de Hausdorff  $X$  i la seva relació amb el semigrup caracteristic de l'espai  $X$ .

Tenim com a primr resultat:

LEMA 1 .- Tota aplicació pròpia i exhaustiva  $f: X \longrightarrow Y$  entre dos espais topològics separats indueix un epimorfisme  $\varphi$  entre els semigrups característics  $S(X)$  i  $S(Y)$  de manera que si  $A \in S(X)$  és  $\varphi(A) = \{(f(x), f(y)); (x,y) \in A\}$ .

Si  $R$  és una relació d'equivalencia sobre l'espai de Hausdorff  $X$  de manera que l'aplicacio canonica  $\pi: X \longrightarrow X/R$  és una aplicacio pròpia tenim, doncs, l'epimorfisme  $\varphi: S(X) \longrightarrow S(X/R)$  d'acord amb el lema 1.

Considerem ara a  $S(X)$  la relació d'equivalència  $A \sim B$  si és  $\text{sat}_{R \times R}(A) = \text{sat}_{R \times R}(B)$  i sigui  $T(X) = S(X)/\sim$  el corresponent conjunt quocient. Ara, la composició de relacions a  $S(X)$  és compatible amb la relació  $\sim$  i per tant podem considerar el semigrup  $(T(X), \cdot)$  de manera que l'aplicació natural  $p: S(X) \longrightarrow T(X)$  és un epimorfisme de semigrups.

TEOREMA 1.- Si  $R$  és una relació d'equivalència a l'espai de Hausdorff  $X$  tal que  $\pi: X \longrightarrow X/R$  és una aplicació pròpia, els semigrups  $T(X)$  i  $S(X/R)$  són isomorfs.

Si  $X$  és compacte i  $X/R$  és  $T_2$  aleshores  $\pi: X \longrightarrow X/R$  és pròpia i ademés  $R \in S(X)$  i si és  $L_R(X) = \{R.A.R; A \in S(X)\}$  s'acompleix:

TEOREMA 2.- Si  $X$  és compacte i  $R$  una relació d'equivalència a  $X$  tal que  $X/R$  és  $T_2$ , els semigrups  $L_R(X)$  i  $S(X/R)$  són isomorfs.

En el cas en que  $R$  és una relació d'equivalència arbitrària a  $X$  i l'espai  $X/R$  és  $T_2$  hom defineix:

$$K(X) = \left\{ A \subset X \times X ; A \text{ saturat per } R \times R, (\pi \times \pi)(A) \text{ tancat a } X/R \times X/R \text{ i } \pi(r(A)) \text{ compacte a } X/R \right\}$$

i podem veure que  $(K(X), \cdot)$  és un semigrup.

TEOREMA 3.- L'aplicació  $\phi: K(X) \longrightarrow S(X/R)$  donada com a  $\phi(A) = \{(\pi(x), \pi(y)); (x,y) \in A\}$  és un isomorfisme de semigrups.

Si  $R$  és una relació oberta, definim:

$$K^*(X) = \left\{ A \subset X \times X ; A \text{ tancat a } X \times X \text{ i saturat per } R \times R \text{ amb } \pi(r(A)) \text{ compacte a } X/R \right\}$$

i tenim:

TEOREMA 4.- Si  $R$  és oberta, hi ha un isomorfisme entre els semigrups  $K^*(X)$  i  $S(X/R)$ .

=====

#### REFERENCIES

- (1). GARCIA MARRERO, M. i altres. TOPOLOGIA. Ed. Alhambra. Madrid
- (2). O'REILLY, B. THE CHARACTERISTIC SEMIGROUP OF A TOPOLOGICAL SPACE. General Topology and its applications. 5(1975) 95-106.